

Epidemická situace v Evropě:

Plošná epidemie stále přetrvává v celé západní a severní Evropě, ale v některých státech již nemocnost klesá. Dominujícím kmenem v Evropě zůstává A/H1N1_{pdm}, nicméně se začíná více prosazovat chřipka typu B.

Situace v ČR:

V 8. kalendářním týdnu v ČR došlo k mírnému poklesu počtu nemocných s akutním respiračním onemocněním včetně chřipky, a to o 5 %. Celková nemocnost aktuálně dosahuje 1 375 nemocných na 100 000 obyvatel. K poklesu dochází u osob do 60 let, u starších osob je naopak evidován mírný vzestup počtu nemocných. Nejvyšší nemocnost nadále eviduje Jihomoravský kraj (1 779/100 000). V kategorii „ILI“ se nemocnost v ČR taktéž nepatrně snížila, a to o necelá 4 %.

Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav ke dni 26.2.2016: v ČR bylo v uvedeném období Ministerstvu zdravotnictví hlášeno celkem **128 klinicky závažných** případů chřipky, z nichž ve **27 případech došlo k úmrtí**. Jako etiologické agens byl v 7 případech prokázán virus chřipky typu B, v 55 případech se jednalo o virus chřipky A, v 62 případech se jednalo o subtyp A/H1N1, ve 2 případech se jednalo o subtyp viru chřipky A/H3N2 a ve dvou případech se jednalo o duální infekci s průkazem viru chřipky typu B a A/H1N1. U převážné většiny pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění a vesměs nebyli očkovaní proti chřipce popř. záznam o tomto očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval od 10 měsíců – 91 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo ve 48 případech o ženy a v 80 případech o muže. Ve 110 případech byla podána antivirotika. Národní referenční laboratoř pro chřipku eviduje v 8. KT 2016 stále vysoký počet indikací k vyšetření respiračních virů – ve výsledcích dosud dominuje A/H1N1_{pdm}, ale je prokazována i chřipka B a další nechřipkové respirační viry. Stále významně převažují vzorky od hospitalizovaných pacientů nad pacienty odebíranými v ambulancích. Tento fenomén je typický pro všechny epidemie, které jsou doprovázené vyšším výskytem komplikovaných případů chřipky.



NRL dále potvrzuje již hlášený záchyt oseltamivir rezistentního kmene a další 2 suspektní případy. Jedná se o vzorky od hospitalizovaných pacientů se základním chronickým onemocněním.

Závěr:

Pokračující chřipková epidemie. Dominujícím kmenem je stále subtyp A/H1N1, typ B a subtyp A/H3N2 ko-cirkulují.

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ

MUDr. Jan Kynčl, Odd. epidemiologie, SZÚp