


SITUACE V EVROPĚ:

Postupně se stále zvyšuje počet pozitivních záchytů v sentinelových vzorcích, během 1. KT 2019 dosáhl v Evropě **44, 6 %**, což je **další výrazný nárůst** (ve stejném období v loňské sezóně byl podíl influenza pozitivních sentinelových pacientů 47,6 %). Poměr A/H1 a A/H3 je stále vyrovnaný, jsou však rozdíly jak mezi jednotlivými členskými státy, tak i mezi ambulantními a hospitalizovanými pacienty. Plošnou epidemii během 1. KT hlásí Dánsko, Estonsko, Gruzie, Francie, Itálie, Malta, Norsko, Švédsko Portugalsko, Slovinsko a Turecko. S výjimkou Turecka, kde dominuje subtyp A/H3, je dominujícím kmenem A/H1.

USA hlásí epidemii ve 30 státech a zatím 16 úmrtí u dětských pacientů. Dominuje A/H1 (více jak 80 % záchytů, nicméně cirkuluje i H3)



Zdroj: www.flunewseurope.org

SITUACE V ČR

Nemocnost je dosud na neepidemické úrovni, jsou však patrné lokální výskyty. V uplynulém KT rovněž výrazně narostl počet sentinelových odběrů, do NRL bylo dále doručeno 15 konfirmačních vyšetření (Praha, Brno, Ostrava). V nálezech převažuje A/H1N1, ale minoritně cirkuluje i subtyp A/H3N2. V kohortě sentinelových pacientů (30 případů) byla chřipka zachycena pouze 2x, z toho v jednom případě byl dourčen subtyp A/H1. Cirkulace chřipky v ČR jednoznačně narůstá, u ambulantně ošetřených pacientů je však dosud v menšině. S rostoucí tendencí se uplatňuje jako etiologické agens vedoucí k hospitalizaci. Tento fenomén však není ničím novým, v různé míře jej zaznamenáváme každý rok.

M.Havlíčková