


Evropa: v 5.KT je plošná epidemie nadále evidována ve většině evropských států včetně našich sousedů - plošnou epidemii hlásí Německo, Rakousko i Polsko. Slovensko situaci hodnotí jako lokální výskyt. Převažuje stále A/H1N1, ale v řadě zemí s různou intenzitou kócirculuje i A/H3N2. Turecko, Ukrajina, Uzbekistán, Lucembursko, Francie, Izrael a Ukrajina hodnotí momentální situaci jako dominanci A/H3. Chřipka B je zcela minoritní. Plošná epidemie tedy přetrvává v celé Evropě (viz mapa níže) a záchytnost chřipky v klinických vzorcích stále převyšuje 50 % ze všech vyšetřených, nicméně je patrný začátek sestupného trendu (55,1 % v 5. KT versus 54,9 % v 6. KT). Výrazně převažuje A/H1N1.



Česká republika: v 6. kalendářním týdnu je **nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1757 nemocných na 100 000 obyvatel**, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 2,5 %. Nejvyšší vzestup nemocnosti (o 9,1 %) je u dospělých ve věkové skupině 25-59 let. Nejvyšší počty nemocných jsou evidovány v Libereckém, Jihomoravském a Zlínském kraji.

V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byt výrazně podhodnocuje skutečnou nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu hlášeno 230 nemocných na 100 000, což představuje další vzestup o 27 % v porovnání s minulým týdnem.

Záchytnost chřipky v klinických materiálech je stále vysoká, nicméně na etiologii ARI se letos více než v minulých letech podílí i respirační syncytiální virus.

V aktuální chřipkové sezoně bylo do 8.2.2019 hlášeno celkem 184 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 31 osob infekci podlehl.

Závěr: Na území ČR přetrvává chřipková epidemie plošného charakteru

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ

MUDr. Jan Kynčl, odd. epidemiologie infekčních nemocí, SZ